NOTE XXVII.

DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DE COLYDIIDE

PAR

A. GROUVELLE.

Apistus parallelus, n. sp.

Elongatus, subparallelus, convexus, opacus, setis brevibus, erectis, flavo-cinereis vestitus, fusco-castaneus. Antennae incrassatae, 2° articulo ad internum angulum secundi inserto. Caput sine oculis subquadratum, disco in longitudine latissime impresso; margine antico arcuato, lateribus subparallelis, subsinuatis, oculis sat prominulis, temporibus brevissimis, extus dentato-productis. Prothorax basin versus modice angustus, tam elongatus quam antice latus, densissime, fortissime, profundeque punctatus, punctis inaequalibus, plerumque confluentibus, disco in longitudinem profunde sulcato, margine antico arcuato, ad extremitates profunde sinuato; lateribus rectis, denticulatis; basi modice arcuata; angulis anticis acutis, posticis obtusis. Elytra ad basin subparallela, ad apicem attenuata et conjunctim subacuminata, 2 et $^1/_2$ tam elongatis quam simul latis, densissime fortiterque lineato-punctatis. — Long. 3 mill.

Allongé, subparallèle, convexe, opaque, garni de soies gris-flaves, courtes, dressées, marron foncé, un peu rembruni. Antennes épaisses, à peu près aussi longues que le prothorax; 2me article inséré sur le bord interne du premier, un peu en avant de l'extrémité. Tête sensiblement aussi longue que large sans les yeux, arrondie en avant, subparallèle et subsinuée sur les côtés; bords latéraux fortement et assez

largement relevés en bourrelet sauf à la base, étroitement dans cette partie; front longitudinalement et brièvement impressionné dans le milieu, bicaréné de chaque côté; tempes très courtes, dentées, saillantes en dehors. Prothorax un peu rétréci à la base, arqué au bord antérieur, environ aussi long que large en avant, longitudinalement, profondément et irrégulièrement sillonné sur le milieu du disque, fortement impressionné à la base de chaque côté du sillon médian, couvert d'une ponctuation très serrée, très grosse, très profonde, irrégulière et souvent confluente; bord antérieur profondément sinué aux extrémités; côtés droits, denticulés; angles antérieurs aigus, émoussés, postérieurs obtus. Ecusson petit, suborbiculaire. Elytres subparallèles à la base, puis atténués vers l'extrémité, subacuminés ensemble au sommet, environ deux fois et demie aussi longs que larges ensemble à la base, arrondis aux épaules, très densément couverts de lignes de gros points serrés; soies dressées, insérées entre les intervalles des points, infléchies latéralement vers l'extrémité et déterminant ainsi des doubles lignes de soies convergentes.

Hab. Sumatra: Palembang (Bouchard), collection A. Grouvelle; Java occidental (Pasteur et Fruhstorfer), collections du Musée de Leide et A. Grouvelle.

La ponctuation des exemplaires de Java est beaucoup moins accentuée que celle de l'exemplaire de Sumatra.

Paris, Novembre 1910.